

# Дезинфекция поверхностей

Эта инструкция поможет провести дезинфекцию для профилактики и борьбы с инфекциями, в том числе и коронавирусом



## 1 Уборка

Перед дезинфекцией уберите лишние предметы и очистите поверхности от загрязнений: столы, стулья, полки, шкафы, подоконники и т.д.



## 2 Защита

Наденьте влагонепроницаемые перчатки, респиратор, защитные очки перед приготовлением рабочего раствора.

## 3 Приготовление рабочего раствора

Для этого разведите **50 мл** средства «Дезэфект» или «Сепотосан-Т» на **10 л** воды.

Указанное соотношение подходит только для средств «Дезэфект» и «Сепотосан-Т».

Для аналогов этих средств потребуется перерассчитать соотношение в большую или меньшую сторону.

### Аналоги:

Если у вас нет средств «Дезэфект» или «Сепотосан-Т», то вы можете воспользоваться рекомендованными аналогами:

- 1) «Ди-хлор», «Жавельон», «Део-хлор» и другие хлорактивные таблетированные препараты с содержанием активного хлора не менее 1,5 грамма в 1 таблетке;
- 2) «Анавидин-Комплит», «Бриллиант классик».




## 4 Дезинфекция

Используйте рабочий раствор для дезинфекции из расчета:

- 100—150 мл на 1 м<sup>2</sup> при протирании ветошью;
- 150—200 мл на 1 м<sup>2</sup> при орошении.

Дезинфицируйте все доступные объекты и поверхности: полы, ручки дверей, столы, стулья, окна и подоконники, мониторы и клавиатуры компьютеров, полки, шкафы, стеллажи и прочие поверхности помещения.



## 5 Экспозиция

Экспозиция — это время обязательного непрерывного действия препарата, и она должна длиться 60 минут.

Вам необходимо выдержать экспозицию препарата полностью, а после этого проветрить помещение в течение 15 минут.